

# Pluvier doré

*Pluvialis apricaria*

Code Natura 2000 : A 140

Classification	Statut juridique
Avès Passériformes Charadriidae	Directive européenne 79/409 : <i>annexes I, II/2 et III/2</i> Convention de Berne : <i>annexe III</i> <i>Chasse autorisée</i>
<b>Statut de conservation : En déclin</b>	


**Description de l'espèce :** corps trapu, tête arrondie et cou bref. En hivernage, dessus et poitrine bariolés de noir et de doré, dessous clair. Souvent en grandes bandes dans les champs labourés et les prairies, associé au vanneau huppé.

Longueur : 25 à 28 cm    Envergure : 53 - 59 cm  
Poids moyen : 140 à 210 g.




© Philippe Prigent LPO – Fiches DIREN Centre

**Répartition géographique :** uniquement migrateur et hivernant en France. Fréquente les grandes plaines, marais, tourbières, landes.



Un réseau ONCFS/FDC d'observateurs, suit annuellement depuis 1994, les tendances d'évolution des populations de pluviers dorés, à partir de 5000 points fixes d'observation en France :

- par 2 recensements de 5 minutes / point des oiseaux vus en décembre et en janvier.



**Evolution de l'indice d'abondance de l'hivernage en France, de 2000 à 2007.**

## Distribution et abondance en janvier 2008

La courbe indique une évolution des effectifs recensés en dents de scie, mais avec une tendance moyenne à la hausse.

Parallèlement aux suivis annuels mis en place par le réseau ONCFS/FDC, un recensement national, à partir d'un échantillon aléatoire de communes, est réalisé chaque année par l'ONCFS, depuis 2005, entre le 5 et le 21 janvier.

Années	Effectif recensé Eure et Loir	Effectif recensé région Centre	Effectif recensé National	Effectif estimé National (hors littoral)
2005	64058	70593	88834	1080000
2006	9702	15734	67139	743614
2007	53120	56153	106834	1295135

**Caractères biologiques :**

- régime alimentaire : insectes, vers, graines, baies ;
- cycles d'activités : diurne, fuit lorsque que le sol gèle ;
- comportement social : les groupes volent rapidement en formation serrée. Souvent associé aux groupes de vanneau huppé. Craintif, toujours en alerte ;
- reproduction : nid dans une cuvette, au sol. 4 œufs. Incubation de 28 à 32 jours, assurée par les 2 adultes. Poussins nidifuges.
- migrations : migrations pré et post-nuptiale, en grands groupes ;
- tendance démographique : effectif nicheur en baisse en Europe ;
- milieux recherchés : préfère les terrains assez humides. Milieux ouverts et plats : grandes plaines, marais, tourbières, landes.

**Etat de conservation : en déclin en Europe.** Le suivi des effectifs hivernants en France, indique cependant une tendance à la hausse.

**Actions favorables à l'espèce :** consacrer 3 % de la S.A.U. à des corridors et trames vertes, avec des couverts herbacés.

- installation d'une bordure enherbée de 20 m de large, en bordure de la Conie ;
- diversification des assolements, avec introduction des prairies naturelles ou à défaut artificielles ;
- donner la préférence aux céréales de printemps, pour conserver des terres nues en hiver ;
- pas de travaux agricoles ou autres dans les zones inondées par la nappe de Beauce.

- **Mesures relatives aux prélèvements par la chasse :**

La régression des effectifs nicheurs en Europe, nécessiterait une attention particulière sur les prélèvements.