

Pie grièche écorcheur

Lanius collurio

Classification	Statut juridique
Avès Passériforme Laniidé	Directive européenne 79/409 : <i>annexe I</i> Convention de Berne : <i>annexe II</i> <i>Espèce protégée</i>
Statut de conservation en déclin	



© Olivier Villa – Fiches DIREN Centre

J	F	M	A	M	J	Jt	A	S	O	N	D

Période de présence sur le site

Répartition géographique :

- la sous-espèce nominale niche dans une grande partie du Paléarctique occidental, du nord de la péninsule ibérique à la Sibérie occidentale ;
- hiverne en Afrique au sud de l'équateur ;
- nicheuse localisée dans la ZPS.

Régime alimentaire :

- insectes (coléoptères, orthoptères et hyménoptères surtout), rongeurs, lézards.

Caractères écologiques :

- *milieux fréquentés* : dans la ZPS, friches, pelouses calcicoles, anciennes carrières, prairies. Tous ces milieux étant parsemés de buissons, épineux surtout (prunelliers, églantiers, aubépines) ;
- *reproduction* : nid dans un arbuste en mai-juin, ponte de 5 ou 6 œufs. Incubation 15 jours, les jeunes quittent le nid à 15 jours.

Etat de conservation :

- **tendance démographique** : en Europe après une baisse la population s'est stabilisée. En France déclin puis récente remontée modérée ;
- **facteurs limitants** : disparition de l'habitat (remembrements, diminution des prairies et du bocage), utilisation des pesticides.

Actions favorables à l'espèce :

- favoriser le retour d'une agriculture extensive (restauration, plantation de haies, conservation des prairies, limitation des pesticides) ;
- gestion des pelouses calcicoles et des anciennes carrières favorable à la biodiversité.